Демидов Максим Раулевич

**ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА АННЕЛИРОВАННЫХ
2-АЦИЛДИГИДРОФУРАНОВ – НОВЫЙ ПОДХОД К ФЛАВОНоиДАМ И
КОНДЕНСИРОВАННЫМ 4H-ПИРАНАМ**

Специальность 02.00.03 – Органическая химия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук

Самара – 2019

Работа выполнена на кафедре органической химии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический университет».

Научный руководитель: **Осянин Виталий Александрович,**
доктор химических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Дильман Александр Давидович,**
доктор химических наук, профессор РАН,
заместитель директора по научной работе ФГБУН
«Институт органической химии им. Н. Д.
Зелинского» РАН

Голованов Александр Александрович,
кандидат химических наук, доцент кафедры
«Химия и химическая технология» ФГБОУ ВО
«Тольяттинский государственный университет»

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», г. Ставрополь

Защита состоится «24 декабря» 2019 г. в 16:00 на заседании диссертационного совета Д 212.217.05 при ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, ауд. 200.

Отзывы по данной работе в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью, просим направлять по адресу: Россия, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус, на имя ученого секретаря диссертационного совета Д 212.217.05; тел./факс (846) 3322122; e-mail: orgchem@samgtu.ru. В отзыве просим указывать почтовый адрес, номер телефона, электронную почту, наименование организации, должность, шифр и наименование научной специальности.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного технического университета (ул. Первомайская, 18) и на сайте диссертационного совета Д 212.217.05 <http://d21221705.samgtu.ru>

Автореферат разослан «___» _____ 2019 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.217.05,
кандидат химических наук, доцент

Ивлева Е.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Флавоноиды – одна из важнейших групп вторичных метаболитов растений, поскольку они участвуют во многих ключевых процессах их роста и развития. На основе флавоноидов возможно создание новых высокоактивных лекарственных препаратов, обладающих противовирусной, противоопухолевой, противовоспалительной, бактерицидной и антиоксидантной активностью. В связи с перспективами использования флавоноидов и их аналогов в медицине, в настоящее время наблюдается значительный рост интереса к изучению действия производных 4*H*-хроменов на организм человека. За последние два десятилетия число исследований в этой области выросло более чем в десять раз и продолжает увеличиваться. Фрагмент 4*H*-хромена, в том числе 2-арил-4*H*-хромена (флав-2-ена), является ключевым в структуре многих биологически активных веществ. Как отдельный класс флавоноидов флаво-2-ены являются редкими представителями, что связано с их высокой химической активностью, однако некоторые 2-арил-4*H*-хромены были выделены из растений. С другой стороны, 4*H*-хромены потенциально сами могут быть синтетическими предшественниками многих других природных флавоноидов и их производных. Изучение биологической активности и химических свойств флаво-2-енов сдерживается их низким содержанием в природных объектах, малой доступностью биологического материала, трудоемкостью методов выделения и очистки.

Способность к поглощению и испусканию излучения некоторыми производными 4*H*-хроменов лежит в основе создания перспективных флуоресцентных зондов для биоимиджинга с высокой чувствительностью, биосовместимостью и специфичностью связывания и для избирательного обнаружения катионов металлов и нуклеофильных анионов в ультранизких концентрациях. Некоторые спироциклические 4*H*-хромены, проявляющие термохромизм, могут применяться в термодатчиках и переключателях, а соединения с фотохромными свойствами перспективны для создания молекулярных оптических элементов памяти. Также разработаны новые органические солнечные элементы на основе фуллеренов, модифицированных производными 4*H*-хромена, обладающие высокой термостабильностью, электронной подвижностью. Однако широкому применению производных 4*H*-хромена препятствует ограниченность набора методов их синтеза, зачастую требующих использования дорогостоящих реагентов и катализаторов. Таким образом, необходимость разработки новых подходов к получению конденсированных 4*H*-пиранов определяет актуальность исследования.

Цель и задачи научного исследования. Целью работы является разработка нового метода синтеза аннелированных 4*H*-пиранов восстановительной перегруппировкой конденсированных 2-ацил-2,3-дигидрофуранов. В связи с этим были поставлены следующие задачи:

- синтез исходных 2-ацил-2,3-дигидробензофуранов и 2-ацил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов;
- поиск оптимальных восстановительных систем, применимых к перегруппировке аннелированных 2-ацил-2,3-дигидрофуранов в замещенные 4*H*-хромены и 1*H*-бензо[*f*]хромены;
- синтез массива 4*H*-хроменов и 1*H*-бензо[*f*]хроменов для выявления границ применимости метода и исследования их биологической активности;
- разработка нового метода синтеза конденсированных дигидроксантенов;

– разработка двухстадийного метода получения гетеро- и карбоаннелированных 4*H*-пиранов, основанного на трехкомпонентном синтезе конденсированных 2-ацил-2,3-дигидрофуранов с последующей их восстановительной перегруппировкой;

– изучение окислительных превращений конденсированных 4*H*-пиранов для расширения возможных путей их использования.

Научная новизна. Предложена новая перегруппировка конденсированных 2-ацил-2,3-дигидрофуранов в функционализированные 4*H*-пираны под действием различных редокс-систем. Рассмотрены ранее не используемые в органическом синтезе восстановительные системы на основе Ga или In в уксусной кислоте, а также на основе Zn и ZrCl₄ в диоксане. Предложены новые направления использования известных восстановительных комбинаций на основе Zn с уксусной кислотой или с галогенидами элементов (BF₃·Et₂O, TiCl₃, SiCl₄, TMSCl, AlCl₃). Показана эффективность системы Sm + TMSCl для синтеза конденсированных 4*H*-пиранов. Получены новые арил- и диарилзамещенные 4*H*-хромены и 1*H*-бензо[*f*]хромены, а также спирозамещенные дигидробензо- и дигидронафтофураны, замещенные дигидробензоксантены и дигидродибензоксантены. Показана возможность эффективного построения гетеро- и карбоаннелированных 4*H*-пиранов из субстратов, содержащих 2-ацил-2,3-дигидрофурановый фрагмент. Синтезированы неизвестные ранее аналоги природных бифлавоноидов вельвичинов окислением 3-арил(алкил)-1*H*-бензо[*f*]хроменов.

Практическая значимость заключается в разработке нового подхода к структурам с потенциальной противодиабетической и антибактериальной активностью. Среди синтезированных 4*H*-хроменов и 2-ацил-2,3-дигидрофуранов найдены ингибиторы α-глюкозидазы, которые в тестах *in vitro* и *in vivo* оказались более эффективными, чем современные зарегистрированные лекарственные препараты. Некоторые из полученных конденсированных 4*H*-хроменов и спиродигидрофуранов подавляют развитие золотистого стафилококка.

Личный вклад автора. Автором был разработан новый метод получения 4*H*-пирановых систем, осуществлен синтез целевых структур и исходных соединений, которые были охарактеризованы современными физико-химическими методами анализа; проведён анализ литературных данных; оформлена химическая часть публикаций по теме диссертации.

На защиту выносятся следующие положения:

– особенности синтеза исходных 2-ацил-2,3-дигидробензофуранов и 2-ацил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов;

– скрининг восстановительных систем и оптимизация метода синтеза 4*H*-хроменов и 1*H*-бензо[*f*]хроменов;

– особенности перегруппировки 2-ацил-2,3-дигидробензофуранов и 2-ацил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов под действием различных восстановительных систем;

– синтез 3',4'-дигидро-1'*H*,3*H*-спиро[бензофуран-2,2'-нафталин]-1'-онов и 3,4-дигидро-1*H*,1'*H*-спиро[нафталин-2,2'-нафто[2,1-*b*]фуран]-1-онов и их перегруппировка в 5,7-дигидро-6*H*-бензо[*c*]ксантены и 12,14-дигидро-13*H*-дibenzo[*a,h*]ксантены;

– многокомпонентные реакции, приводящие к конденсированным 2-ацил-2,3-дигидрофуранам и их перегруппировка в аннелированные 4*H*-пираны;

– окислительная димеризация и окислительная перегруппировка 4*H*-хроменов и 1*H*-бензо[*f*]хроменов;

– окислительные превращения 5,7-дигидро-6*H*-бензо[*c*]ксантенов и 12,14-дигидро-13*H*-дibenzo[*a,h*]ксантенов.

Достоверность полученных данных обеспечена тщательностью проведения эксперимента и применением современных физико-химических методов исследования структуры и чистоты полученных соединений: данными рентгеноструктурного анализа, спектроскопии ЯМР ¹H и ¹³C, включая двумерные корреляционные гетеро- и гомоядерные эксперименты, хромато-масс-спектрометрии, масс-спектрометрии высокого разрешения, ИК спектроскопии, элементного анализа.

Объекты исследования: 2-ацил-2,3-дигидрофураны и 4*H*-пираны, 4*H*-хромены, 1*H*-бензо[*f*]хромены, дигидробензоксантены, соли дигидробензоксантиения, спирозамещенные дигидрофураны.

Апробация работы и публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 3 научных статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных исследований, 1 патенте, а также в 10 тезисах докладов всероссийских и международных научных конференций: 21st European Symposium on Organic Chemistry (ESOC) (Vienna, Austria, 2019), II Международная конференция «Современные синтетические методологии для создания лекарственных препаратов и функциональных материалов» (Екатеринбург, 2018), Всероссийская молодежная научная школа-конференция с международным участием «Актуальные проблемы органической химии – 2018» (Новосибирск–Шерешеш, 2018), XXVIII Российская молодежная научная конференция с международным участием «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2018), VII Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2017), II Всероссийская молодежная конференция «Проблемы и достижения химии кислород- и азотсодержащих биологически активных соединений» (Уфа, 2017), VI Всероссийская конференция с международным участием «Современные проблемы химической науки и фармации» (Чебоксары, 2017), Второй междисциплинарный симпозиум и молодежный форум по медицинской, органической и биологической химии (Крым, 2015), International congress of heterocyclic chemistry «KOST-2015» (Москва, 2015), XXIV Менделеевская конференция молодых ученых (Волгоград, 2014).

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, посвященного способам получения 2-замещенных 4*H*-хроменов, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка литературы. Работа изложена на 198 страницах, содержит 9 таблиц и 3 рисунка. Список цитируемой литературы включает 206 источников. Нумерация соединений в автореферате идентична нумерации в диссертации.

Диссертация выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части государственного задания на научно-исследовательскую работу (4.6764.2017/БЧ).

Автор выражает глубокую благодарность к.х.н. Бабкову Д. А. (ВолГМУ) и к.х.н. Тюрину А. П. (НИИНА РАМН им. Г. Ф. Гаузе) за проведение биологических испытаний, к.х.н. Рыбакову В. Б. за проведение рентгеноструктурных исследований; к.х.н. Осипову Д. В. за плодотворные дискуссии по поводу полученных данных и ценные советы в проведении экспериментальных работ, доценту Баймуратову М. Р. и доценту Головину Е. В. за съемку спектров ЯМР полученных соединений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.1. Синтез 2-ацил-2,3-дигидробензо- и 2-ацил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов

По разработанной ранее методике* каскадной реакцией между 1,2-нафтохинон-1-метидами, генерируемыми *in situ* из 2-нафтольных оснований Манниха **1**, и илидами пиридиния, полученными также *in situ* из солей 2-оксоэтилпиридиния **2** под действием основания, синтезирован ряд как новых, так и описанных ранее 2-ацил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов **3а–ак**, содержащих в R¹ и R² связанные с ароматическим ядром донорные (Alk, MeO, OH), акцепторные заместители (Hal, CN, NO₂), а также редокс-активные группы (Br, I, NO₂).

R¹=R³=H: R²=Ph (**3а***, 74%), 4-Br-C₆H₄ (**3b**, 80%), 1-Ad (**3c**, 78%), 4-Et-C₆H₄ (**3d**, 66%), 4-Cl-C₆H₄ (**3e**, 78%), 4-MeO-C₆H₄ (**3f**, 71%), 4-HO-C₆H₄ (**3g**, 50%), 3-I-C₆H₄ (**3h**, 70%), 4-NC-C₆H₄ (**3i**, 72%), 1-(3-HO-Ad) (**3j**, 54%), *t*-Bu (**3k**, 64%); R¹=H, R²=Ph, R³=1-Ad (**3l**, 77%); R³=H и R²=Ph: R¹=4-MeO-C₆H₄ (**3m***, 70%), 3,4-(MeO)₂-C₆H₃ (**3n**, 69%), 3,4,5-(MeO)₃-C₆H₂ (**3o***, 75%), тиофен-2-ил (**3p**, 82%), 2,2'-(бифиофен-5-ил) (**3q**, 70%), 4-Cl-C₆H₄ (**3r**, 72%); R³=H и R²=тиофен-2-ил: R¹=Ph (**3s**, 68%), тиофен-2-ил (**3t**, 74%), 4-MeO-C₆H₄ (**3u**, 72%); R³=H и R²=4-MeO-C₆H₄: R¹=4-MeO-C₆H₄ (**3v***, 67%), 4-Cl-C₆H₄ (**3w**, 76%), 4-Me-C₆H₄ (**3x**, 71%), тиофен-2-ил (**3y**, 81%); R³=H и R²=4-Br-C₆H₄: R¹=тиофен-2-ил (**3z**, 77%), 4-Me-C₆H₄ (**3aa**, 82%), пиридин-4-ил (**3ab**, 84%), 3-MeO-C₆H₄ (**3ac**, 76%); R³=H: R¹=R²=3,4,5-(MeO)₃-C₆H₂ (**3ad**, 69%); R¹=4-MeO-C₆H₄, R²=4-HO-C₆H₄ (**3ae**, 65%); R¹=4-Cl-C₆H₄, R²=4-HO-C₆H₄ (**3af**, 56%); R¹=3-NO₂-C₆H₄, R²=4-Me-C₆H₄ (**3ag**, 74%); R¹=2-F-C₆H₄, R²=4-Me-C₆H₄ (**3ah**, 81%); R¹=4-MeO-C₆H₄, R²=4-F-C₆H₄ (**3ai**, 72%); R¹=Ph, R²=4-F-C₆H₄ (**3aj**, 77%); R¹=4-Cl-C₆H₄, R²=Me (**3ak**, 56%)
Описанные ранее соединения **3** отмечены знаком "*"

Реакция является диастереоселективной, и образуется только *транс*-изомер, что подтверждается данными спектроскопии ЯМР ¹H. Протоны дигидрофуранового цикла проявляются в виде дублетов с вицинальной КССВ ³J_{1,2}=4.0–8.7 Гц, что согласуется с литературными данными.

Конденсацией предшественников *o*-хинонметидов **4а–с** и бромидов 2-оксо-2-арилэтилпиридиния **2** в присутствии стехиометрических количеств DBU были синтезированы 2-ароил-2,3-дигидробензофураны **5а–j** также в виде *транс*-изомеров. Для протонов дигидрофуранового фрагмента КССВ составляет ³J_{2,3}=6.4–8.0 Гц.

R²=H и R¹=Ph: R³=H (**5а***, 54%, из **4c**), 4-Me (**5b**, 61%, из **4c**), 4-Cl (**5c**, 76%, из **4c**), 4-MeO (**5d**, 67%, из **4c**), 3,4,5-(MeO)₃ (**5e**, 66%, из **4c**); R¹=H: R²=5-Cl, R³=H (**5f**, 52%, из **4c**); R²=5-Cl, R³=4-MeO (**5g**, 73%, из **4c**); R²=5-*t*-Bu, 7-(1-Ad), R³=H (**5h**, 60%, из **4a**); R²=5-*t*-Bu, R³=H (**5i**, 54%, из **4b**); R²=5,6-Me₂, R³=H (**5j**, 57%, из **4b**)

Описанные ранее соединения **3** отмечены знаком "*"

* Osyani V. A., Osipov D. V., Klimochkin Yu. N. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 5505.

1.2. Синтез 3*H*-спиро-2,2'-бензофуранов и 1'*H*-спиро-2,2'-нафтофуранов

В качестве предшественников илидов пиридиния были использованы также соли пиридиния на основе циклических кетонов (1-тетралона **6a**, 6,7-диметил-1-тетралона **6b**, 1-инданона **6c** и 6,7-дигидробензо[*b*]тиофен-4(5*H*)-она **6d**), реакции которых с *o*-хинонметидами приводят к неописанным в литературе представителям спиро-дигидроаренофурановых систем **7a–p**. Так, при взаимодействии иодметилатов фенольных оснований Манниха **4b** с солями пиридиния на основе 1-тетралона **6a** или 6,7-диметил-1-тетралона **6b** в присутствии DBU были получены соответствующие спирозамещенные дигидробензофураны **7a–j**.

$R^3=H$: **6a**;

$R^3=CH_3$: **6b**

$R^2=R^3=H$: $R^1=1\text{-Ad}$ (**7a**, 71%), MeO (**7b**, 67%), Cl (**7c**, 62%), CN (**7d**, 58%), F (**7e**, 69%), *t*-Bu (**7f**, 63%), Ph (**7g**, 67%); $R^1=R^2=Me$, $R^3=H$ (**7h**, 69%); $R^2=H$ и $R^3=Me$: $R^1=MeO$ (**7i**, 63%), *t*-Bu (**7j**, 75%)

Аналогично иодметилатам **4b** из оснований Манниха нафталинового ряда **1a–c** и солей пиридиния **6a,b** в присутствии DBU синтезированы спирозамещенные дигидронафтофураны **7k–n**. В реакции были использованы также предшественники илидов пиридиния **6c,d**, при конденсации которых с 1-(диметиламинометил)-2-нафтолом **1a** в отсутствие основания были получены спиросоединения **7o** и **7p**.

7p, 62% (из **1a**)

$R^1=R^2=H$ (**1a**);

$R^1=t\text{-Bu}$, $R^2=H$ (**1b**);

$R^1=R^2=t\text{-Bu}$ (**1c**)

$n=2$: $R^1=R^2=R^3=H$ (**7k**, 74%); $R^1=t\text{-Bu}$, $R^2=R^3=H$ (**7l**, 73%);

$R^1=R^2=H$, $R^3=Me$ (**7m**, 80%); $R^1=R^2=t\text{-Bu}$, $R^3=H$ (**7n**, 79%);

$n=1$: $R^1=R^2=R^3=H$ (**7o**, 59%)

2.1. Перегруппировка 2-ацил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов в 1*H*-бензо[*f*]хромены

В качестве модельных субстратов для изучения перегруппировки были выбраны 2-ацил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фураны с различной карбонильной активностью: 2-бензоил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуран **3a** и (1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуран-2-ил)(адамантан-1-ил)метанон **3c**, а также 2-(4-бромбензоил)-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуран **3b**, содержащий редокс-активный заместитель.

$R=Ph$ (**3a**→**8a**), 4-Br- C_6H_4 (**3b**→**8b**), 1-Ad (**3c**→**8c**)

В качестве редокс-систем использованы 3 типа восстановительных комбинаций: металлы в протонной среде, металлы в присутствии кислот Льюиса, соединения металлов в низковалентном состоянии. В представленных типах варьировалась активность металла, сила

кислоты Бренстеда и оксофильность кислоты Льюиса. Набор изученных восстановительных систем приведен в табл. 1.

Таблица 1.

Восстановление модельных 2-ацил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов **3a–c**

редокс-система	субстрат	выход 8a–c , %	время реакции, ч
Zn + AcOH, Δ	3a	8a : 85	1.5
	3b	смесь продуктов	1.5
	3c	0	15
Zn + CX ₃ COOH X=F (72 °C), Cl (100 °C)	3a	0	– ^a
Zn + TiCl ₃ , диоксан, Δ	3a	8a : 76	4
	3b	8b : 72	4
	3c	8c : следы	12
Zn + TMSCl, диоксан, Δ 10 моль. % H ₂ O	3a	8a : 72	2
	3b	смесь продуктов	2
	3c	8c : 34	15
Zn + SiCl ₄ , диоксан, Δ	3a	8a : 70	4
Zn + BF ₃ ·Et ₂ O, диоксан, Δ	3a	8a : 70	4
	3c	8c : следы	12
Zn + ZrCl ₄ , диоксан, Δ	3a	8a : 41	1
	3b	смесь продуктов	1
	3c	8c : 79	5
Zn + AlCl ₃ , диоксан, Δ	3a	смесь продуктов	1
	3c	8c : 68	5
Zn + MCl _x , диоксан, Δ MCl _x =ZnCl ₂ , CdCl ₂ , InCl ₃	3a	0	12
Zn (и Zn/Cu-пара), диоксан, Δ	3a	0	12
TiCl ₃ , диоксан, Δ	3a	0	12
M + AcOH, Δ M=Fe, Ni, Cd, Tl	3a	0	12
M + AcOH, Δ M=Mg, Sm, Al	3a	0	– ^a
Ga + AcOH, Δ	3a	8a : 82	8
	3b	8b : 81	8
In + AcOH, Δ	3a	8a : 79	15 ^b
	3b	8b : 77	15
SnCl ₂ , EtOH, HCl, Δ	3a	0	10
Zn + NH ₄ Cl, H ₂ O/EtOH, Δ	3b	смесь продуктов	5
Ga + TMSCl, диоксан, Δ	3a	0	12
Sm + TMSCl, диоксан, Δ	3a	8a : 81	4
	3b	смесь продуктов	4
	3c	8c : следы	10
Sm + TMSCl + NaI, диоксан, Δ	3a	61 ^c	6

^a происходит быстрое растворение металла с выделением водорода;

^b реакция катализируется образующимся In(OAc)₃;

^c образуется 3-фенил-2,3-дигидробензо[*ff*]хромен **9a**

Анализ экспериментальных данных показывает, что в перегруппировке 2-ароил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов **3a,b** могут быть использованы комбинации металлов средней активности (Zn ($\varphi^0 = -0.76$ В), Ga ($\varphi^0 = -0.56$ В), In ($\varphi^0 = -0.34$ В)) в уксусной кислоте. Применение более активных, чем цинк, металлов (Mg ($\varphi^0 = -2.37$ В), Sm ($\varphi^0 = -2.3$ В), Al ($\varphi^0 = -1.7$ В)) в уксусной кислоте не приводит к ожидаемому продукту перегруппировки из-за их быстрого растворения, сопровождающегося выделением водорода. В качестве альтернативы также могут быть использованы восстановительные системы на основе Zn или Sm и галогенидов элементов с высокой оксофильностью (Ti ($\Theta = 1.0$), V ($\Theta = 1.0$), Si ($\Theta = 0.8$), Zr ($\Theta = 0.8$), Al ($\Theta = 0.8$)),* выступающих в роли кислот Льюиса. При перегруппировке 2-(4-бромбензоил)-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фурана **3b** установлено, что многие редокс-системы вызывают частичное дебромирование, однако комбинации на основе Ga (In) в AcOH или Zn и TiCl₃ в диоксане позволяют получить 3-(4-бромфенил)-1*H*-бензо[*f*]хромен **8b** без примеси продукта дегалогенирования. Следует отметить, что (1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуран-2-ил)(адамантан-1-ил)метанол **3c** не восстанавливается под действием большинства исследованных редокс-систем. Удовлетворительный результат был получен только с применением Zn в присутствии ZrCl₄ или AlCl₃.

2.2. Перегруппировка ареноконденсированных 2-ацил-2,3-дигидрофуранов и их спироаналогов под действием металлов в уксусной кислоте

В оптимизированных условиях осуществлена перегруппировка 2-ароил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов **3** в 3-арил-1*H*-бензо[*f*]хромены **8a,b,d-aa** с использованием восстановительных систем на основе металла (M=Zn, Ga, In) в AcOH (табл. 2).

Таблица 2.

Синтез 3-арил-1*H*-бензо[*f*]хроменов **8a,b,d-aa**

№	R ¹	Ar	R ²	выход ^a , %	время, ч	M
8a	H	Ph	H	85	1.5	Zn
				82	8	Ga
				79	15	In
8b	H	4-Br-C ₆ H ₄	H	81	8	Ga
				77	15	In
8d	H	4-Me-C ₆ H ₄	H	72	2.0	Zn
8e	H	4-F-C ₆ H ₄	H	77	1.5	Zn
8f	H	4-Cl-C ₆ H ₄	H	75	1.5	Zn
8g	H	3-I-C ₆ H ₄	H	62	8	Ga
8h	H	4-NC-C ₆ H ₄	H	76	8	Ga
8i	H	4-Et-C ₆ H ₄	H	66	1.5	Zn
8j	H	4-MeO-C ₆ H ₄	H	58	2.0	Zn
				74	8	Ga
8k	H	нафталин-1-ил	H	71	1.5	Zn
8l	H	Ph	1-Ad	79	2.0	Zn

* Керр К. Р. *Inorg. Chem.* **2016**, *55*, 9461.

Таблица 2 (продолжение)

8m	Ph	Ph	H	90	4.0	Zn
8n	3,4-(MeO) ₂ -C ₆ H ₃	Ph	H	83	4.5	Zn
8o	3,4,5-(MeO) ₃ -C ₆ H ₂	Ph	H	66	4.5	Zn
8p	4-MeO-C ₆ H ₄	Ph	H	74	4.5	Zn
8q	4-MeO-C ₆ H ₄	4-MeO-C ₆ H ₄	H	71	4.5	Zn
8r	3,4,5-(MeO) ₃ -C ₆ H ₂	3,4,5-(MeO) ₃ -C ₆ H ₂	H	68	4.5	Zn
8s	тиофен-2-ил	Ph	H	88	4.0	Zn
8t	2,2'-битиофен-5-ил	Ph	H	81	3.5	Zn
8u	4-Cl-C ₆ H ₄	4-Cl-C ₆ H ₄	H	83	3.5	Zn
8v	4-Cl-C ₆ H ₄	4-Me-C ₆ H ₄	H	88	4.0	Zn
8w	Ph	тиофен-2-ил	H	77	4.0	Zn
8x	тиофен-2-ил	тиофен-2-ил	H	89	4.0	Zn
8y	4-Cl-C ₆ H ₄	4-НО-C ₆ H ₄	H	79	4.0	Zn
8z	4-MeO-C ₆ H ₄	4-НО-C ₆ H ₄	H	76	4.0	Zn
8aa	3-АсNH-C ₆ H ₄ ^b	4-Me-C ₆ H ₄	H	74	5.0	Zn

^a указан препаративный выход;

^b в исходном 1,2-дигидронафтофуране **3ag** R¹=3-NO₂-C₆H₄

Интересно отметить, что при перегруппировке нитрофенилзамещенного дигидронафтофурана **3ag** под действием Zn в AcOH был получен 1-(3-ацетиламинофенил)-3-(4-метилфенил)бензо[*f*]хромен **8aa** как результат последовательно протекающих

реакций гидрирования нитрогруппы и ацилирования образующегося амина. Использование менее активных, чем цинк, Ga или In в синтезе 3-(4-бромфенил)-1*H*-бензо[*f*]хромена **8b** из 2-(4-бромбензоил)-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фурана **3b** позволяет избежать образования продукта дегалогенирования. Более того, низкая активность Ga в редокс-процессах, но достаточная для осуществления перегруппировки, позволила получить 3-(3-иодфенил)-1*H*-бензо[*f*]хромен **8g**, что было недостижимым результатом при использовании других восстановительных систем. Также было установлено, что добавление 20 моль. % кислоты Льюиса (например, InCl₃) ускоряет превращение 2-бензоил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фурана **3a** под действием In в AcOH в 3-фенил-1*H*-бензо[*f*]хромен **8a**. В отсутствие катализатора полная конверсия наблюдается только за 15 ч.

Перегруппировка 2-(4-метоксибензоил)-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фурана **3f** под действием Zn в AcOH приводит к смеси 3-(4-метоксифенил)-1*H*-бензо[*f*]хромена **8j** и 3-(4-метоксифенил)бензо[*f*]хромена **9b**. Образование бензохромена **9b** можно объяснить частичным диспропорционированием 1*H*-бензохромена **8j** в присутствии Zn(OAc)₂, образующегося при растворении металла в уксусной кислоте.

При кипячении в течение 20 ч предварительно полученного 1*H*-бензохромена **8j** в AcOH в отсутствие Zn было выявлено образование лишь небольших количеств 3-(4-метоксифенил)бензо[*f*]хромена **9b** методом ТСХ, однако добавление 10 моль. % Zn(OAc)₂ приводит к значительному ускорению реакции.

Подобно 2-ароил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранам **3** в перегруппировку под действием Zn в AcOH вступают 2-ароил-2,3-дигидробензофураны **5a–e, h** с образованием 2-арил-4*H*-хроменов **10a–f**. Однако в случае незамещенных по 3-му положению субстратов **5f, g, i, j** основными продуктами являются, как правило, 3-(2-гидроксиарил)пропан-1-оны **11a–d**.

2.3. Перегруппировка спиروزамещенных дигидроаренофуранов

Изучаемая перегруппировка была использована также в построении практически не описанных ранее полициклических 4*H*-пирановых систем **12a–n**. Под действием Zn в AcOH происходит раскрытие 3*H*-спиро-2,2'-бензофуранов **7a–j** с образованием 5,7-дигидро-6*H*-бензо[*c*]ксантенов **12a–j**.

Интересно отметить, что схожие по строению со 3*H*-спиро-2,2'-бензофуранами **7a–j** 2-ароил-2,3-дигидробензофураны **5f, g, i, j**, отличающиеся только отсутствием этиленового мостика, в идентичных условиях проведения перегруппировки раскрываются в 3-(2-гидроксиарил)пропан-1-оны **11a–d**. В то же время спиروزамещенные дигидробензофураны **7a–j** легко превращаются в конденсированные 4*H*-хромены **12a–j**. Движущей силой процесса, по-

видимому, является переход от напряженных спироструктур к энергетически более выгодным полициклическим системам.

Синтез 12,14-дигидро-13*H*-дibenzo[*a,h*]ксантенов **12k–m** и 12,13-дигидробензо[*f*]индено[1,2-*b*]хромена **12n** был осуществлен из соответствующих спироидигидронафтофуранов **7k–m,o** в аналогичных условиях.

2.4. Перегруппировка 2-бензоилдигидроаренофуранов под действием Sm и TMSCl

Успешный синтез 2-фенил-4*H*-хроменов **10g,h** был осуществлен из соответствующих 2-бензоил-2,3-дигидробензофуранов **5i,j** при замене восстановительной системы на основе Zn в AcOH на комбинацию Sm с TMSCl в диоксане, что позволило избежать образования 3-(2-гидроксиарил)пропан-1-онов **11c,d**.

Интересный результат был получен при взаимодействии 2-бензоил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фурана **3a** с избытком SmI₂, генерируемого *in situ* из Sm, TMSCl и NaI в диоксане. Первоначально образующийся 3-фенил-1*H*-бензо[*f*]хромен **8a** реагирует с избытком SmI₂, и после обработки реакционной смеси водой был получен 3-фенилбензо[*f*]хромен **9a**. При уменьшении времени реакции до 2 ч удалось выделить 3-фенил-1*H*-бензохромен **8a**, что подтверждает промежуточное его образование.

2.5. Синтез замещенных 1*H*-бензо[*f*]хроменов с использованием комбинаций Zn с галогенидами элементов

В качестве альтернативы редокс-системам на основе металлов в AcOH были также рассмотрены комбинации Zn с кислотами Льюиса, с помощью которых синтезирован ряд замещенных 1*H*-бензо[*f*]хроменов **8ab–as** (Табл. 3), а также **8a–c** (Табл. 1). В качестве акцепторов кислорода были

использованы кислоты Льюиса с высокой оксофильностью: TiCl_3 , ZrCl_4 , $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$, Me_3SiCl . Также показана возможность использования комбинаций Zn с SiCl_4 или AlCl_3 на примере синтеза 1*H*-бензо[*f*]хроменов **8a,c** (Табл. 1).

Таблица 3.

Синтез 1*H*-бензо[*f*]хроменов **8ab–as** на основе Zn и галогенидов элементов

№	R ¹	R ²	выход ^a , %	LA	время, ч
8ab	тиофен-2-ил	4-Br-C ₆ H ₄	73	TiCl ₃	4
8ac	4-Me-C ₆ H ₄	4-Br-C ₆ H ₄	70	TiCl ₃	4
8ad	3-MeO-C ₆ H ₄	4-Br-C ₆ H ₄	67	TiCl ₃	4
8ae	пиридин-4-ил	4-Br-C ₆ H ₄	72	TiCl ₃	4
8af	4-Cl-C ₆ H ₄	4-MeO-C ₆ H ₄	68	TiCl ₃	4
8ag	тиофен-2-ил	4-MeO-C ₆ H ₄	71	TiCl ₃	4
8ah	4-Cl-C ₆ H ₄	Ph	68	Me ₃ SiCl	4
8ai	4-MeO-C ₆ H ₄	тиофен-2-ил	62	Me ₃ SiCl	4
8aj	4-Me-C ₆ H ₄	4-MeO-C ₆ H ₄	65	Me ₃ SiCl	4
8ak	Ph	4-F-C ₆ H ₄	63	BF ₃ ·Et ₂ O	5
8al	2-F-C ₆ H ₄	4-Me-C ₆ H ₄	72	BF ₃ ·Et ₂ O	5
8am	4-MeO-C ₆ H ₄	4-F-C ₆ H ₄	68	BF ₃ ·Et ₂ O	5
8an	H	<i>t</i> -Bu	66	ZrCl ₄	5
8ao	Ph	<i>t</i> -Bu	61	ZrCl ₄	8
8ap	4-Cl-C ₆ H ₄	<i>t</i> -Bu	65	ZrCl ₄	8
8aq	тиофен-2-ил	1-Ad	77	ZrCl ₄	6
8ar	4-Cl-C ₆ H ₄	Me	79	ZrCl ₄	5
8as	4-Cl-C ₆ H ₄	Cl(CH ₂) ₃ ^b	57	ZrCl ₄	5

^a указан препаративный выход;

^b в исходном 1,2-дигидронафтофуране R²=циклопропил

Использование различных комбинаций Zn с кислотами Льюиса позволяет расширить границы применимости метода. Так, например, с помощью редокс-системы $\text{Zn} + \text{TiCl}_3$ удалось получить ряд бромфенилзамещенных 1*H*-бензохроменов

8ab–ae без примеси продуктов дегалогенирования. Ранее это было достижимо только при использовании Ga или In в AcOH . Кроме того, при перегруппировке спироидигидронафтофурана **7p** под действием Zn и TiCl_3 была получена новая гетероциклическая система 4,6-дигидро-5*H*-бензо[*a*]тиено[3,2-*h*]ксантена **12o**, недоступная при использовании Zn в AcOH из-за восстановления тиофенового цикла.

Особый интерес представляет комбинация Zn с ZrCl_4 , с помощью которой осуществлена перегруппировка малореакционноспособных по отношению к другим восстановительным системам (1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуран-2-ил)алкилметанонов **3** в 3-алкил-1*H*-бензохромены **8an–as** (Табл. 3). В реакцию вступают также 1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фураны **3**

(предшественники для **8an–ap**), содержащие объемную *tert*-бутильную группу в ацильном фрагменте. Было установлено, однако, что перегруппировка [1-(4-хлорфенил)-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуран-2-ил]циклопропилметанона **3al** сопровождается раскрытием трехчленного цикла с образованием 3-(3-хлорпропил)-1-(4-хлорфенил)-1*H*-бензо[*f*]хромена **8as**.

Также вместо хлорида циркония (IV) был использован AlCl_3 , но реакция протекает с меньшим выходом (Табл. 1).

2.6. Превращения на основе 1,2-дигидро-2'*H*-спиро[бензо[*f*]хромен-3,1'-нафталин]-2'-она

При перегруппировке полученного из 2-нафтольного основания Манниха **1a** димера 1,2-нафтохинон-1-метида **13** под действием Zn и TMSCl в диоксане ожидалось получить дигидродинафтооксепин **14**, однако был выделен продукт раскрытия спироцикла – силилированный бис-нафтол **15a**.

При обработке бис-триметилсилильного производного **15a** фторидом тетрабутиламмония в смеси $\text{H}_2\text{O}/\text{TГФ}$ с последующим высаливанием хлоридом натрия получен комплекс 1,1'-(этан-1,2-диил)бис(нафталин-2-ола) с тетрабутиламмонийхлоридом **15b**. Разрушение аддукта **15b** происходит при его растворении в этилацетате, насыщенном газообразным HCl , с образованием бис-нафтола **15c**. Бис-нафтол **15c** также синтезирован в одну стадию восстановительной перегруппировкой димера 1,2-нафтохинон-1-метида **13** под действием Zn и $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ в диоксане. Строение комплекса **15b** доказано методом РСА (рис. 1). Аддукт

Рис. 1. Структура соединения **15b** в представлении атомов эллипсоидами тепловых колебаний с 40% вероятностью

15b стабилизирован системой водородных связей между протонами гидроксильных групп бис-нафтола и хлорид-анионом, длина которых составляет 2.291 и 2.283 Å, при этом угол Н···Сl···Н равен 103°98'.

2.7. Обобщенный механизм перегруппировки бензаннелированных 2-ацил-2,3-дигидрофуранов в 4H-хромены под действием различных восстановительных систем

Обобщая экспериментальные данные по перегруппировке 2-ацил-2,3-дигидрофуранов в 4H-хромены под действием металлов в присутствии кислот Бренстеда или Льюиса, можно предположить, что первоначально происходит двухкратное одноэлектронное восстановление карбонильной группы дигидрофуранов через кетил-радикал **XXIII** с образованием интермедиата **XXIV**, дальнейшее превращение которого зависит от условий. Раскрытие дигидрофуранового цикла в интермедиате **XXIV** через фенолят **XXV**, протонирование которого в кислой среде с последующей кетализацией кетона **IV** и дегидратацией хромола **V** приводит к 4H-хромену. В присутствии оксофильных кислот Льюиса возможно дезоксигенирование **XXIV** с образованием металлокарбеноида **XXVI**, α -элиминирование из которого галогенида металла приводит к карбену **VII**. Конечные 4H-хромены являются результатом 1,2-сигматропного сдвига ароксильной группы в карбене **VII**. При этом [1,2]-гидридный сдвиг с образованием метиленбензофурана **XXVII** не наблюдается. По-видимому, предпочтительное протекание 1,2-ароксильного сдвига, представляющего собой более редкий процесс по сравнению с миграцией атома водорода из β -положения обусловлено большей термодинамической устойчивостью шестичленного цикла. Потенциально возможная димеризация кетил-радикалов **XXIII** с образованием алкоголятов пинаконов **XXVIII** не наблюдается, по-видимому, по пространственным причинам.

Перегруппировка димера 1,2-нафтохинон-1-метида **13** под действием Zn и TMSCl подобно восстановлению цинком в уксусной кислоте протекает не через карбен, а «силиленолят» **15a** из-за энергетической выгоды ароматизации.

При использовании комбинации Zn и Ac₂O вместо восстановительной системы на основе Zn и AcOH в перегруппировке 2-бензоил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фурана **3a** был получен 1-(3-оксо-3-фенилпропил)нафталин-2-илацетат **16a** вместо 3-фенил-1*H*-бензо[*f*]хромена **8a**. Образование ацетата **16a** может происходить только в том случае, если реакция протекает через промежуточный интермедиат **XXV**, который быстро ацилируется уксусным ангидридом до ацетата енола **16b**. Однако при хроматографической очистке на силикагеле, по-видимому, происходит гидролиз эфира енола **16b** в нафтилацетат **16a**.

3.1. Синтез карбо- и гетероаннелированных 4*H*-пиранов на основе метиленактивных карбонильных соединений

Двухстадийный синтез, основанный на мультикомпонентной конденсации альдегидов **A**, предшественников илидов пиридиния **B** и метиленактивных карбонильных соединений **C** с образованием *транс*-2-ацил-2,3-дигидрофуранов **D** и их перегруппировке в замещенные 4*H*-пирановые системы **E**, представляет собой новый подход к карбо- и гетероаннелированным 4*H*-пиранам.

3.1.1. Синтезы на основе димедона

Трехкомпонентной реакцией между димедоном **19a**, ароматическими альдегидами и солями пиридиния **2,6a** синтезирован ряд *транс*-2-ацил-3-арилдигидрофуранов **20a–d** и их спироаналогов **20e–i**, восстановительной перегруппировкой которых под действием Sm и TMSCl получены 2,4-диарилтетрагидрохромен-5-оны **21a–c** и 7-арилгексагидробензоксантен-8-оны **21d–h**. В случае 2-ароил-2,3-дигидрофуранов **20a–d**, неаннелированных с ароматическим кольцом, перегруппировка не протекала под действием Zn в уксусной кислоте, а использование восстановительных систем на основе Zn и галогенидов элементов (TiCl₃, TMSCl, BF₃·Et₂O, ZrCl₄) приводило к смеси неидентифицированных продуктов. В спектрах ЯМР ¹H КССВ для протонов Н-2 и Н-3 2-ароил-2,3-дигидрофуранов **20a–d** лежит в пределах ³J_{2,3}=4.4–4.8 Гц, что характерно для *транс*-изомеров.

Ar¹=Ph: Ar²=Ph (**21a**, 36%), 4-MeO-C₆H₄ (**21b**, 64%);
Ar¹=4-Cl-C₆H₄, Ar²=4-Et-C₆H₄ (**21c**, 54%)

Ar¹=Ph (**21d**, 86%), 4-MeO-C₆H₄ (**21e**, 65%),
2-F-C₆H₄ (**21f**, 52%), 4-Me-C₆H₄ (**21g**, 82%),
4-Cl-C₆H₄ (**21h**, 72%)

3.1.2. Синтезы на основе 1,3-дикарбонильных соединений гетероциклического ряда

Аналогично синтезу арилбензоксантенонов **21d–h** разработан новый двухстадийный метод получения дигидронафтопиранопиранов **23a–d**, основанный на трехкомпонентной конденсации 6-метил-4-гидрокси-2-пирона **19b**, соли пиридиния **6a** и ароматических альдегидов с последующей восстановительной перегруппировкой образующихся

спирозамещенных дигидрофуранопиранов **22a–e**. Образование диастереомера спиро дигидрофурана **22b** с *транс*-расположением ароматического кольца при С-3 и кетогруппы при С-2 доказано данными рентгеноструктурного анализа (рис. 2). Таким образом, трехкомпонентный синтез конденсированных 2-ацил-2,3-дигидрофуранов также протекает *транс*-диастереоселективно, как и синтез 2-ацил-2,3-дигидробензофуранов **3,5** из предшественников *o*-хинонметидов и илидов пиридиния.

Рис. 2. Структура соединения **22b** в представлении атомов эллипсоидами тепловых колебаний с 40% вероятностью

При конденсации 4-гидроксикумарина **19c** или 1-гидрокси-3*H*-бензо[*f*]хромен-3-она **19d** с ароматическими альдегидами и солью пиридиния **6a** были получены спиро дигидрофураны **24a–j**. Дальнейшей перегруппировкой спироциклов **24a–f** под действием Zn и ZrCl₄ в диоксане осуществлен синтез 7-арилдигидробензохроменохроменонов **25a–f**. Использование Sm и TMSCl в качестве восстановительной системы приводило лишь к смеси неидентифицированных продуктов.

4.1. Окислительные превращения 4*H*-хроменов и 1*H*-бензо[*f*]хроменов

Разработка новых методов окисления 4*H*-хроменов открывает путь к синтезу различных флавоноидов и их синтетических аналогов. При окислительной димеризации незамещенных по 1-ому положению 1*H*-бензохроменов **8a,c,f,i,l** под действием SeO₂ был получен ряд

спирозамещенных димеров **26a–e**, структурный фрагмент которых встречается в составе бифлавоноидов вельвичинов. Также было показано, что вместо SeO_2 с успехом могут быть использованы I_2O_5 и MnO_2 . Строение спиродинбензохромена **26a** было доказано методом РСА (рис. 3). В случае 2,4-диарил-4*H*-хроменов **10b,d** и 1,3-диарил-1*H*-бензохроменов **8m,p,q,ah,ai** окисление приводит к образованию 2-ароилбензо- **30a,b** и нафтофуранов **30c–g** в результате перегруппировки пиранового цикла. Иначе происходит взаимодействие с фенилйодозоацетатом, которое в случае 3-фенил-1*H*-бензохромена **8a** дает 3,3'-дифенил-1*H*,1*H'*-1,2'-бисбензо[*f*]хромен **31**.

Рис. 3. Структура соединения **26a** в представлении атомов эллипсоидами тепловых колебаний с 35% вероятностью

Обнаруженная окислительная димеризация 4*H*-хроменов позволяла надеяться осуществить синтез природного бифлавоноида вельвичина Е **27**. С этой целью из пирогаллола **28a** был осуществлен семистадийный синтез описанного в литературе 5,7,8-триметоксифлавона **28h**, дезоксигенированием которого под действием смеси LiAlH_4 и AlCl_3 получен 5,7,8-триметоксифлав-2-ен **28i**, который предполагалось использовать как предшественник бифлавоноида **27**.

Однако окисление 5,7,8-триметоксифлав-2-ена **28i** SeO_2 в кипящем диоксане не привело к ожидаемому вельвичину Е. Под действием SeO_2 происходило раскрытие пиранового цикла с образованием халкона **29a** и 4,6,7-триметокси-2-бензоилбензофурана **29b**.

Был проведен скрининг различных окислителей в реакции с флаван-2-еном **28i**, однако в большинстве случаев основным продуктом являлся халкон **29a**, а HgO и TeO₂ оказались инертны. Проведение реакции при более низкой температуре также не привело к целевому продукту (табл. 4).

Таблица 4.

Окисление 5,7,8-триметоксифлаван-2-ена **28i**^a

окислитель	количество экв. окислителя	продукт	выход ^b , %	время реакции, ч
SeO ₂ , 100 °C	1	29a 29b	58 15	4
SeO ₂ , 50 °C	1	29a	66	4
SeO ₂ , 25 °C	1	29a	32	8
I ₂ O ₅ , 100 °C	1	29a	61	1
Ag ₂ O, 100 °C	2	29a	73	8
MoO ₃ ·H ₂ O, 100 °C	5	29a	70	15
MnO ₂ , 100 °C	5	смесь	–	10
HgO, 100 °C	4	–	0	15
TeO ₂ , 100 °C	2	–	0	15

^a реакция проводилась в диоксане;

^b указан препаративный выход

4.2. Реакции гидридного переноса с участием 5,7-дигидробензо-6H-ксантенов и их бензанаалогов

Замещенные 4H-хромены и их бензанаалогии легко окисляются с образованием бензопирилиевых солей, являющихся аналогами антоцианинов. Нами был синтезирован ряд солей 5,7-дигидробензо[с]ксантения **32a–g** дегидрированием 5,7-дигидробензо-6H-ксантенов **12a–c,f–h** под действием тритилперхлората.

12,14-Дигидро-13H-дibenzo[*a,h*]ксантен **12k** при кипячении в ксилоле в присутствии Pd/C подвергается дегидрированию с образованием 14H-дibenzo[*a,h*]ксантена **33**, при дальнейшей обработке которого тритилперхлоратом была получена дibenзоксантениевая соль **34**.

При действии избытка эфирата трехфтористого бора в присутствии воды 12,13-дигидробензоинденохромен **12n** и 12,14-дигидродибензоксантен **12k** подвергаются диспропорционированию с образованием тетрафторборатов **35a,b**, а также тетрагидробензоинденохромена **36a** и тетрагидродибензоксантина **36b** в виде *транс*-изомеров. *Транс*-конфигурация **36a,b** подтверждается тем, что протоны дигидропиранового цикла взаимодействуют друг с другом с КССВ $^3J_{7a,12a}=10.3$ Гц (для **36a**) и $^3J_{7a,13a}=10.3$ Гц (для **36b**). Добавление воды необходимо для образования аниона BF_4^- из эфирата.

5.1. Исследование противодиабетической и антибактериальной активности аннелированных 2-ацил-2,3-дигидрофуранов и 4*H*-пиранов

В ходе выполнения диссертационной работы был получен массив 2-ацил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов **3a–ak**, 2-ацил-2,3-дигидробензофуранов **5a–j**, а также 1*H*-бензо[*f*]хроменов **8a–as** и 3-арил-4*H*-хроменов **10a–h**, которые могут представлять интерес с точки зрения биологической активности. Было проведено обширное тестирование указанных соединений на противодиабетическую и антибактериальную активности.

В связи с отсутствием данных по испытаниям аналогов синтезированных структур на антигликемическую активность изначально был проведен первичный отбор с целью выявления потенциально активных соединений, ингибирующих действие α -глюкозидазы. Данные испытаний *in vitro* показали, что соединения **3g**, **5c**, **8i,v**, **10a,c** обладают наибольшей активностью. В качестве стандарта использовалась акарбоза, которая применяется для профилактики сахарного диабета 2-го типа. Следует отметить, что эффективная доза 2-(4-гидроксибензоил)-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фурана **3g** и 2,4-дифенил-4*H*-хромена **10a** оказалась значительно ниже, чем у акарбозы. Более того, экспериментальные данные *in vivo* подтверждают высокую активность соединений **10a** и **3g**. При введении с пищей соединений **10a** и **3g** у лабораторных мышей уровень мальтозы в крови становился значительно ниже, чем при использовании эквивалентной дозы акарбозы.

эффективная доза
акарбозы 543.6 μM

Для ряда карбо- и гетероконденсированных 4*H*-пиранов и 2-ацил-2,3-дигидрофуранов была исследована противомикробная активность на штаммах золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*). Исследования проводились с независимым контролем, тестировалось 100 мкг вещества, в качестве стандарта использовалось 30 мкг известного антибиотика ванкомицина. Наибольшая антибактериальная активность была обнаружена у *N*-[3-(3-(*n*-толил)-1*H*-бензо[*f*]хромен-1-ил)фенил]ацетамида **8aa** и *транс*-2-(4-метоксибензоил)-6,6-диметил-3-фенил-3,5,6,7-тетрагидробензофуран-4(2*H*)-она **20b**. Однако зона угнетения роста штамма-возбудителя для препаратов **8aa** и **20b** оказалась ниже зоны действия ванкомицина, которая составила 28 мм.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Определены оптимальные условия перегруппировки 2-ацилдигидрофуранов в 4*H*-хромены и их бензаналоги с использованием различных восстановительных систем. Установлено, что в реакции не эффективны комбинации на основе металлов и галогенидов элементов с низкой оксофильностью (ZnCl_2 , CdCl_2 , InCl_3). Предложены новые восстановительные системы для органического синтеза: Ga в AcOH, In в AcOH, Zn с ZrCl_4 в диоксане. Показано, что наиболее мягкими редокс-системами являются комбинации Ga или In в AcOH, а также Zn и TiCl_3 , а комбинации Zn с ZrCl_4 или AlCl_3 – наиболее активными.
2. Синтезирован широкий ряд 2-арил-4*H*-хроменов, 1*H*-бензо[*f*]хроменов, а также 5,7-дигидро-6*H*-бензо[*c*]ксантенов и их бензаналогов восстановительной перегруппировкой соответствующих конденсированных 2-ацил-2,3-дигидрофуранов.
3. Разработан двухстадийный метод синтеза карбо- и гетероаннелированных 4*H*-пирановых систем трехкомпонентной конденсацией активированных карбонильных соединений, альдегидов и солей пиридиния с последующей перегруппировкой 2-ацил-2,3-дигидрофуранов в 2,4-диарилхроменоны, 7-арилтетрагидробензоксантеноны, 7-арилбензопиранохроменоны и 7-арилбензохроменохроменоны.
4. Впервые осуществлен синтез спирозамещенных аналогов бифлавоноидов вельвичинов окислительной димеризацией незамещенных по 1-ому положению 3-арил(алкил)-1*H*-бензохроменов под действием SeO_2 , I_2O_5 и MnO_2 . Установлено, что окисление 3-фенил-1*H*-бензо[*f*]хромена $\text{PhI}(\text{OAc})_2$ приводит к 3,3'-дифенил-1*H*,1*H'*-1,2'-бибензо[*f*]хромену. Показано, что при окислении 1,3-диарил-1*H*-бензо[*f*]хроменов и 2,4-диарил-4*H*-хроменов

происходит перегруппировка в 1-арил-2-ароилнафто[2,1-*b*]фураны и 3-арил-2-ароилбензофураны.

5. Установлено, что 5,7-дигидробензо-6*H*-ксантены и их бензаналоги участвуют в процессах межмолекулярного гидридного переноса с образованием солей дигидробензо[*c*]ксантения.
6. Изучение биологической активности синтезированных веществ выявило соединения, эффективно подавляющие действие α -глюкозидазы, а также обладающие умеренной активностью в отношении золотистого стафилококка.

Основные результаты диссертации изложены в следующих публикациях

Статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК

1. Spasov A. A. Synthesis, *in vitro* and *in vivo* evaluation of 2-aryl-4*H*-chromene and 3-aryl-1*H*-benzo[*f*]chromene derivatives as novel α -glucosidase inhibitors / Babkov D. A., Osipov D. V., Klochkov V. G., Prilepskaya D. R., **Demidov M. R.**, Osyanin V. A., Klimochkin Yu. N. // *Bioorg. Med. Chem. Lett.* – 2019. – V. 29. – N. 1. – P. 119–123.
2. **Демидов М. Р.** Окислительная перегруппировка 4*H*-хроменов в 2-ароилбензофураны под действием диоксида селена / Лапшина М. Ю., Осипов Д. В., Осянин В. А., Климошкин Ю. Н. // *Химия гетероцикл. соед.* – 2017. – Т. 53. – № 9. – С. 1053–1056.
3. Spasov A. A. Synthesis and biological evaluation of 2-acylbenzofuranes as novel α -glucosidase inhibitors with hypoglycemic activity / Babkov D. A., Prokhorova T. Y., Sturova E. A., Muleeva D. R., **Demidov M. R.**, Osipov D. V., Osyanin V. A., Klimochkin Yu. N. // *Chem. Biol. Drug. Des.* – 2017. – V. 90. – N. 6. – P. 1184–1189.

Патенты, тезисы докладов и материалы конференций

4. Патент 2597363 РФ. Способ получения 3-арил-1*H*-бензо[*f*]хроменов / Осянин В. А., **Демидов М. Р.**, Осипов Д. В., Климошкин Ю. Н. – Заявлено - 29.12.14. – Опубл. - 19.08.16.
5. Ключков В. Г. Исследование новых фенилхромановых производных в качестве ингибиторов α -глюкозидазы *in vitro* и *in vivo* / **Демидов М. Р.** // В сб. статей. «Фармация» Спецвыпуск, 24-25 апреля 2017 г – СПб.: Изд-во СПХФА, 2017, 679–682 с.
6. Osipov D. V. Zn- and Sm-Induced reductive rearrangement of 2-acyl-2,3-dihydrobenzofurans into 4*H*-chromenes / Osyanin V. A., **Demidov M. R.**, Klimochkin Yu. N. // В сб. тез. докл. 21st European Symposium on Organic Chemistry (ESOC). Vienna, Austria, 2019. – P. 468.
7. **Демидов М. Р.** Восстановительная перегруппировка спиродигидрофуранопиранонов. Синтез пиранохроменонов и их бензаналогов / Осипов Д. В., Осянин В. А., Климошкин Ю. Н. // В сб. тез. докл. II Международная конференция «Современные синтетические методологии для создания лекарственных препаратов и функциональных материалов». Екатеринбург, 2018. – С. 424.
8. **Демидов М. Р.** Новый метод синтеза конденсированных 4*H*-пиранов / Осипов Д. В., Осянин В. А., Климошкин Ю. Н. // В сб. тез. докл. Всероссийская молодежная научная школа-конференция с международным участием «Актуальные проблемы органической химии – 2018». Новосибирск – Шерегеш, 2018. – С. 50. (*устный доклад*)
9. **Демидов М. Р.** Синтез 2-ароил-3-арил-2,3-дигидрофуранов и их перегруппировка в полифункциональные 4*H*-пираны / Осипов Д. В., Осянин В. А., Корольков К. А., Климошкин Ю. Н. // В сб. тез. докл. XXVIII Российская молодежная научная конференция с

- международным участием «Проблемы теоретической и экспериментальной химии». Екатеринбург, 2018. – С. 424.
10. **Демидов М. Р.** Синтез и окислительно-восстановительные превращения 6,7-дигидро-5*H*-бензо[*c*]ксантенов / Осипов Д. В., Осянин В. А., Климочкин Ю. Н. // В сб. тез. докл. II Всероссийская молодежная конференция «Проблемы и достижения химии кислород- и азотсодержащих биологически активных соединений». Уфа, 2017. – С. 115–116.
 11. **Демидов М. Р.** Синтез и окисление диоксидом селена 4*H*-хроменов и 1*H*-бензо[*f*]хроменов / Осипов Д. В., Осянин В. А., Климочкин Ю. Н. // В сб. тез. докл. VI Всероссийская конференция с международным участием «Современные проблемы химической науки и фармации». Чебоксары, 2017. – С. 24.
 12. Осянин В. А. Реакции *o*-хинонметидов с амбифильными реагентами в синтезе кислородсодержащих гетероциклов / Осипов Д. В., **Демидов М. Р.**, Климочкин Ю. Н. // В сб. тез. докл. Второй междисциплинарный симпозиум и молодежный форум по медицинской, органической и биологической химии. Крым, 2015. – С. 70.
 13. Осянин В. А. *o*-Хинонметиды как ключевые интермедиаты в синтезе кислородсодержащих конденсированных гетероциклов / Осипов Д. В., **Демидов М. Р.**, Лукашенко А. В., Климочкин Ю. Н. // В сб. тез. докл. International congress of heterocyclic chemistry «KOST-2015». Москва, 2015. – С. 159.
 14. **Демидов М. Р.** Получение 2-ароил-1,2-дигидронафто[2,1-*b*]фуранов и 1*H*-бензохроменов / Осянин В. А. // В сб. тез. докл. XXIV Менделеевская конференция молодых ученых. Волгоград, 2014. – С. 52. (устный доклад)

Автореферат отпечатан с разрешения диссертационного совета Д 212.217.05
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
(протокол №8 от 22 октября 2019 г.)
Заказ №____. Тираж 100 экз.

Формат 60x84/16. Отпечатано на ризографе.

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Отдел типографии и оперативной печати
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244